

Magne B6



Magne-B6 i përket grupit e shtesave minerale.

470 magnesium lactate dehydrate + 5 mg pyridoxine hydrochloride

Kur përdoret MAGNE- B6?

Përmban Magnez dhe B6

Defiçiti i magnezit i izoluar ose i kombinuar, i cili mund të shprehet me ndonjë nga simptomat e mëposhtme:

- Nervozizëm, ankth i moderuar, irritabilitet, eksitabilitet, lodhje, dobësi, mungesë energjie, çrregullime të lehta të gjumit, dhimbje koke,
- Spazma, krampe muskulare
- Çrregullime të traktit gastrointestinal, dhimbje barku, konstipacion

Kur të mos përdorin Magne-B6?

Magne B6-nuk do të përdoren në rastet e mëposhtme:

- Alergji e njohur tek ndonjë nga përbërësit
- Insuficencë akute renale

Për shkak të pranisë së saharoze, ky medikament është i kundërlindikuar për diabetikët.

Vetëm në të rriturit dhe fëmijët mbi 6 vjet.

Për fëmijët nën 6 vjeç janë ofruar formulime të përshtatshme.

Mund të përdoret MAGNE- B6 gjatë shtatzënisë dhe laktacionit?

Ky ilaç mund të përdoret gjatë shtatzënisë vetëm nëse e përkrahur nga një mjek.

, nëse jeni në laktacion duhet të shmanget.

Dozimi dhe mënyra e përdorimit.

Të rriturit: 6 deri 8 tableta në ditë, të ndarë në 2 ose 3 doza gjatë ngrënies.

Fëmijët mbi 6 vjet (rreth 20 kg): 2 deri në 4 tableta, të ndarë në 2 ose 3 doza gjatë ngrënies;
10-20 mg/kg/ditë

Tabletat duhet të gëlltiten të gjitha me një gotë uji të madhe .

Magnezi është minerali I katërt për nga sasia në trupin e njeriut. 50% e tij ndodhet intraqelizor dhe pjesa tjetër ndodhet në kockat e skeletit.

Mg është i nevojshëm në rregullimin e tensionit arterial, lehtëson sindromin premenstrual, redukton riskun për diabet mellitus II dhe për osteoporozë.